

Aus der Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfkrankheiten, Erlangen.

Lane Medical Library



Über vom Ohr ausgehende Allgemein- infektion bzw. Sinusthrombose.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen Medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Manfred Steiner

Medizinalpraktikant aus Altensteig.

Tag der mündlichen Prüfung: 31. Januar 1936.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.

1936

1937/171

Dekan: Geh. Medizinalrat Prof. Dr. med. Friedrich Jamin
Referent: Seine Magnificens Rektor Prof. Dr. med. F. Specht

Meinen lieben Eltern in Dankbarkeit gewidmet!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

I. Bericht über das vorliegende Schrifttum.

In den Jahren 1826—1862 wurden die ersten Beobachtungen über den ursächlichen Zusammenhang von Sinus- und Jugularisthrombose mit Eiterungen im Schläfenbein gemacht. Doch blieb die damalige konservative Behandlung erfolglos. Im Jahr 1884 eröffnete *von Zaufal* als erster den Sinus und unterband die Jugularis interna. Seither wurden die Kenntnisse der vom Ohr ausgehenden Allgemeininfektion und Sinusthrombose und ihre operative Behandlung derart entwickelt, daß das einst hoffnungslose Leiden in der Mehrzahl der Fälle geheilt werden kann¹⁾.

Haymann schreibt über die Behandlung der vom Ohr ausgehenden Allgemeininfektion und Sinusthrombose Folgendes: Sie hat in erster Linie chirurgisch zu erfolgen in der Ausschaltung des Herds, von dem aus die Erreger und ihre Giftstoffe ins Blut gelangen. Daneben haben gegen die Erreger wirksame Mittel und Mittel, die den Widerstand des Körpers steigern, mitzuwirken. Schließlich ist allgemein der Körper im Kampf gegen die Infektion zu unterstützen. Über die Unterbindung der Jugularis interna herrschen große Meinungsverschiedenheiten. Die einen unterbinden in jedem Fall, andere nur bei bestimmter Anzeige. Nach einer Zusammenstellung von 300 Fällen erfolgte Heilung bei Unterbindung in 52%, ohne Unterbindung in 57%. Der Grund, warum der Prozentsatz der Heilungen bei Vornahme der Unterbindung nicht höher liegt, ist darin zu suchen, daß es sich dabei häufig um von vorneherein schwere aussichtslose Fälle handelt. *Alexander* erzielte bei grundsätzlicher Venenunterbindung bis 1923 85% Heilungen, *Haymann* 83%

1) Denker und Kahler, Handbuch der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.

bei nicht grundsätzlicher Unterbindung; er schreibt: Die Gesamtergebnisse bei grundsätzlicher Unterbindung sind nicht besser als bei der bei bestimmter Anzeige. Die Venenausschaltung verhindert den Übertritt ansteckenden Materials ins Blut nicht mit Sicherheit, und die Jugularisunterbindung hat gewisse Gefahren (technisch, weitere Thrombosierung). Zusammenfassend fordert er die Jugularisunterbindung.

1. vor der Sinusoperation:

- a) bei Jugularisthrombophlebitis,
- b) bei schweren Allgemeinerscheinungen, Bulbusthrombose,

2. nach der Sinusoperation:

- a) wenn die Jugularis selbst ergriffen ist,
- b) bei schweren Allgemeinerscheinungen, wenn Bulbusthrombose aufgedeckt wird, bei Wandgangrän und jauchigem Zerfall,
- c) wenn die Thrombenentfernung im Sinus Sigmoides wegen Blutung nicht möglich ist,

3. im weiteren Verlauf:

- a) wenn sich die Erkrankung auf die Jugularis ausbreitet,
- b) wenn der Thrombus auf den Bulbus übergreift,
- c) wenn wandständige Thromben nicht erreicht werden und die Allgemeininfektion weiter besteht.

Die durchschnittliche Heilungsziffer operierter Sinusthrombosen ist 65 %. Eingriffe haben nur nach strenger Anzeige aber dann gründlich zu erfolgen, also weder grundsätzliche Jugularisunterbindung noch grundsätzliche Thrombenentfernung, sondern man muß sich den Verhältnissen anpassen und darf vor wiederholten Eingriffen nicht zurückschrecken.

Auf die seit Herausgabe des Handbuchs von *Denker* und *Kasler*, im Jahr 1927, im *Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde* aufgeführten Fälle im Einzelnen einzugehen, würde ins Uferlose führen, ohne daß sich neue Gesichtspunkte ergäben.

II. Beobachtungen aus der Erlanger Klinik.

Vom Jahr 1925 bis Ende 1935 sind 50 Fälle zu verzeichnen. Von diesen wurden 26 geheilt (bei 12 wurde die Jugularis unterbunden, bei 14 nicht), 22 sind gestorben (von denen bei 13 die Jugularis unterbunden wurde, bei 9 nicht); 2 Fälle kamen ungeheilt zur Entlassung.

Also sind statistisch zu erfassen: 48 Fälle.

geheilt: 26 in $\frac{0}{100}$: 54

„ bei Jugularisunterbindung 12 „ $\frac{0}{100}$: 48

„ ohne „ „ 14 „ $\frac{0}{100}$: 60

Es ist nun zu untersuchen:

1. Ob von den 12 geheilten Fällen mit Jugularisunterbindung der eine oder andere wohl auch ohne Jugularisunterbindung geheilt wäre.
2. Ob von den 13 gestorbenen Fällen mit Jugularisunterbindung der eine oder andere infolge der Unterbindung tödlich verlaufen ist.
3. Ob von den 14 geheilten Fällen ohne Jugularisunterbindung die Unterbindung zwecklos bzw. sogar schädlich gewesen wäre.
4. Ob von den 9 gestorbenen Fällen ohne Jugularisunterbindung die Unterbindung lebensrettend gewirkt hätte.

zu 1.

1. Lina P., 20 Jahre. Aufnahme 13. 6. 1935.

Wegen Otitis media chronica rechts mit Durchbruch der Membrana Shrapnelli, Polypen, Cholesteatom am 29. 6. 1935 *Radikaloperation*. Am 8. 7. wegen Temperaturanstiegs auf 40° *Nachoperation*: Die Sinuspunktion ergibt kein Blut; daher Freilegung und Eröffnung: Unter starker Blutung wird der frische rote Thrombus ausgeschwemmt. Anschließend *Unterbindung der vena jugularis interna*. Die hohe Temperatur bleibt bestehen. Am 11. 7. wird aus dem sinus transversus bei Blutstrom ein großer frischer Thrombus entfernt. Ab 18. 7. ist die Patientin fieber- und beschwerdefrei. Am 26. 7. *Nachoperation*: Da im Bulbus sich Eiter findet, wird vom Bulbus venae jugularis geschlitzt

bis zur Unterbindungsstelle. Der weitere Verlauf ist fieber- und beschwerdefrei. — Entlassung am 29. 9. 1935.

2. Bericht von *H. Richter*: Hans B., 5½ Jahre. Aufnahme 4. 3. 1934.

Beiderseitige otitis media acuta bei Scharlach zwingt am 19. Tag wegen Mastoiditis zur Antrotomie rechts: Im Antrum Eiter. Sinus und Dura in kleinem Umfang freigelegt, o. B. Trotzdem hohe Temperaturen, leichte neuritis nervi optici rechts. 1. *Nachoperation*: Sinuswand am oberen Knie erkrankt, Schlitzung bis gegen Bulbus ergibt eitrig zerfallenden Thrombus, *Unterbindung der vena jugularis interna* oberhalb des Abgangs der vena facialis anterior. 2 Tage nachher wegen Fieberanstiegs 2. *Nachoperation*: Vena fac. ant. und jug. communis thrombosiert. Heraus-schneiden des Venengeflechts der rechten Halsseite. Nach einer Woche wegen Verdachts eines perihulbären Abszesses Ausräumung des Bulbus. Einige Tage darauf Anschwellung oberhalb des rechten Schlüsselbeins. Eröffnung eines großen hinter dem Schlüsselbein gelegenen Abszesses. *Unterbindung der vena jug. comm.* an Einmündung in vena anonyma. Herausnahme dieses Venenstumpfes. Nach Überwindung einer Nackenphlegmone, Kopfhauterysipels und Masern Heilung. Es war ausgedehnte operative Freilegung nötig. Entlassung am 12. 7. 1934.

3. Margarete K., 40 Jahre. Aufnahme 15. 9. 1934.

Vor 8 Tagen Ohrenstechen rechts, 2 Tage später plötzliche Eiterung, vor 4 Tagen Aufmeißelung, seit 2 Tagen Fieber — 39°. 16. 9. *Operation*: Ausgedehnte Freilegung. Durafreilegung o. B. Vollständige Aufmeißelung. Gehörgangsplastik. 20. 9. *Sinusoperation*: Sin-transversusfreilegung bis 4 cm hinter das obere Knie. Punktion negativ. Freilegung bis zum Bulbus. Schlitzung: Es findet sich ein oben frischer, nach dem Bulbus zu älterer Thrombus. Nach dessen Entfernung starke Blutung. Wegnahme der äußeren Sinuswand. 30. 9. 2. *Nachoperation*: V. jug. rechts ist deutlich druck-schmerzhaft. Schlitzung bis Confluens sinuum: Entfernung neuer Thromben. Im Bulbus findet sich geruchloses eitriges Sekret. Freilegung der V. jug. comm. Punktion

ergibt Blut. *Unterbindung der V. fac. ant. und der jug. int. oben, der jug. comm. unten.* Heraus[schneiden dieses Venendreiecks. Fieber- und beschwerdefreier weiterer Verlauf. 9. 12. geheilt in Poliklinik entlassen. 28. 1. 1935 Nach[schau beschwerdefrei.

4. Anna W., 56 Jahre. Aufnahme 16. 4. 1934.

Bei otitis media acuta purulenta 4 tagelanges „Frösteln“, Temperaturen -41° , Übelkeit, Schwindel, „Drehen nach rechts“, im Röntgenbild ausgebreitete Verschleierung veranlassen am 16. 4. *Sinusfreilegung*: o. B. Wegen Temperaturanstiegs $-39,8^{\circ}$ am 19. 4. *Nachoperation*: Sin.wand dunkelrotblau. Punktion neg. Schließung. Es wird ein 4–5 cm langer frischer roter Thrombus entfernt. Anschließend *Jug.-Unterbindung* vor Zusammenfluß mit V. fac. comm. Nach langsamem Heilverlauf ohne Besonderheiten am 13. 7. 1934 entlassen.

5. Ernst K., 11 Jahre. Aufnahme 9. 1. 1935.

Wegen Schüttelfrösten bei otitis med. chron. links wird am 9. 1. der *Sinus freigelegt*: pulsiert, Probepunktion ergibt Blut. Wegen Temperaturanstiegs am 15. 1. 1. *Nachoperation*: Sinuspunktion neg. Ausgedehnte Freilegung: im unteren Abschnitt ist eine lochförmige Öffnung, aus der vereiterte Thrombenmassen hervorquellen. Keine Blutung. Nach oben ein Thrombenteil derb erhalten, *Jugularisunterbindung*. Am 26. 1. nochmals hoher Fieberanstieg. 2. *Nachoperation*: Aus dem unteren Teil der Halswunde wird ein Abszeß entleert, wohl durch Drüsen entstanden. Hierauf fieber- und beschwerdefreier Verlauf. Entlassung am 24. 2. 1935.

6. Karl Sch., 19 Jahre. Aufnahme 10. 12. 1933.

Bei otitis med. chron. rechts mit randständigem Durchbruch seit $\frac{1}{2}$ Jahr Ohrlaufen, seit 2 Tagen Erbrechen, Kopfschmerzen in der rechten Schläfengegend, Schwindelgefühl und Schüttelfröste. Am 10. 12. 1. *Radikaloperation*: Die freigelegte Sinuswand ist verdickt, mit Auflagerungen besetzt, fühlt sich hart an, zeigt keine deutliche Pulsation. Bei weiterer Freilegung wird sie nach oben normal, nach unten findet sich seitlich ein großes Loch, aus dem kein Blut quillt. Die Schließung ergibt eine verdickte Wand bei leerem Hohl-

raum. 2. *Jug. int.-Unterbindung* unterhalb des Abgangs der V. fac. ant. Die fac. ant. ist stark mit Blut gefüllt, während die jug. int. kein Blut enthält; wird geschlitzt, enthält grauroten Thrombus, der entfernt wird. Am 20. 12. wegen Temperatursteigerung *Nachoperation*: Kein Weiterstreiten der Thrombose. Durchspülung der jug. zum bulbus leicht möglich. Kochsalzlösung erscheint im Bulbus nur leicht blutig verfärbt. Weiterer Verlauf fieber- und beschwerdefrei. Entlassung am 28. 4. 1934.

7. Georg J., 32 Jahre. Aufnahme 26. 10. 1932.

Bei otitis med. chron. dextra et sinistra mit Cholesteatom seit 6 Jahren Ohrlaufen links, seit 2 Tagen Schüttelfröste, Schmerzen im Hinterkopf und bei Bewegungen im Nacken, Schwindelgefühl. 26. 10. *Operation*: Sinusfreilegung; Wand graugrün, in der Mitte ein linsengroßes Loch, aus dem Thrombenteile hervorsehen. Sinus ist zusammengefallen, füllt sich nicht bei Druck auf Halsseite. Mehrfache Punktion ergibt kein Blut. Der Sinus wird nach oben geschlitzt, ein 5—6 cm langer Thrombus entfernt, worauf Blutung, erfolgt. Nach unten wird die Sinuswand weitgehend herausgeschnitten. Die V. jug: wird aufgesucht, ist zusammengefallen, wird eröffnet, von oben kommt kein Blut, von unten blutet es stark. *Doppelte Unterbindung und Durchschneidung der Vene*. Am 12. 11. wegen Temperaturanstiegs *Nachoperation*: Die seitliche Wand des Sinus wird weitgehend abgetragen. Am 8. 12. Radikaloperation links. Fieber- und beschwerdefreier Verlauf. Am 18. 2. 1933 in Poliklinik entlassen.

8. Christine Sch. Aufnahme 23. 6. 1932.

1923 radikal operiert. Gestern erfuhr die Beweglichkeit des Kopfes eine immer größere Einschränkung, die Druckempfindlichkeit des hinteren oberen Halsdreiecks nahm zu. Am 13. 7. *Operation*: Sinus freigelegt, pulsiert nicht, ist parallelastisch, Punktion neg., Heraus schneiden der äußeren Sinuswand. Sinus ausgefüllt mit dunkelrotem, z. T. organisierten Thrombus. Anschließend Jugularisfreilegung. *Jug.* zusammengefallen, enthält keinen Thrombus, wird unterbunden; ebenso eine seitlich der Carotis liegende nach

hinten aufwärts ziehende Vene. Wegen Temperaturanstiegs am 17. 7. *Nachoperation*: Der Sinus ist von Thrombenmassen ausgefüllt, eitrig-blutig erweicht, werden ausgeräumt. Weiterer Verlauf o. B. Am 8. 10. zur ambulanten Behandlung entlassen.

9. Klara Sch., 11 Jahre. Aufnahme 11. 8. 1931.

Bei ot. med. chron. sin. mit Cholest. u. ot. med. chron. dextr. mit vollkommener Zerstörung der pars tensa von Jugend an Ohrlaufen rechts; Hörvermögen schon seit Jahren schlecht; seit 5 Tagen Klopfschmerzen im linken Ohr, seit gestern Fieber und Schüttelfrost, Schwindel, Erbrechen. 12. 8. *Operation*: Sinusfreilegung, Punktion ergibt Blut. Bei Eröffnung findet sich im Sinus transversus ein z. T. mit der Wand verwachsener, organisierter, z. T. frischer roter Thrombus. Heraus schneiden der Wand. Bei der Verfolgung des Sinus nach abwärts findet sich ein weiterer großer Thrombus, wird herausgezogen, wonach nur geringe Blutung eintritt. Hierauf wird die linke *vena jug. int.* nach dem Eintritt der *fac.* doppelt *unterbunden*, nicht durchschneiden. Glatte Verlauf. Am 8. 10. in Poliklinik entlassen.

10. Georg L., 23 Jahre. Aufnahme 25. 4. 1930.

Ot. med. ac. pur. dextra. Aus 2 Abszessen unterhalb Tragus dringt dicker gelbgrüner Eiter. (Im Gehörgang kein Eiter). Da die Druckschmerzen zunehmen, am 5. 5. *Operation*: Aufmeißelung. Sinuswand verdickt, graurot. Sinus parallelförmig, pulsiert. Druck auf Jugularis ergibt vermehrte Spannung. Keine Punktion. Am 13. 5. wegen Schmerzen im Hinterkopf und auf dem Scheitel, ferner starker Druckempfindlichkeit der Jugularisgegend *Nachoperation*: Sinuspunktion neg. Sinus wird geschlitzt, enthält bei verdickter Wand dunkelroten ablösbaren Thrombus. Aus Sinus transversus blutet es, Tamponade; aus Bulbus kein Blut. *Unterbindung der V. jug. int.*: Jug. ist zusammengefallen, kein Thrombus. Weiterer Verlauf fieber- und beschwerdefrei. Am 9. 8. 1930 zur ambulanten Nachschau entlassen.

11. Josef M., 35 Jahre. Aufnahme 13. 5. 1929.

Vor 3 Jahren nach Erkältung Stechen im rechten Ohr, übelriechender Ausfluß. Seit Mitte März 1929 Schwellung

hinter dem rechten Ohr druckschmerzhaft. Am 14. 5. *Operation*: Freilegung ergibt perisinuösen Abszeß, in dem 2 cm lang der Sinus freiliegt, nicht pulsiert; bei Punktion kein Blut ergibt. In Sinus-sigmoideusmitte findet sich ein Loch. Schlitzung, Ausräumung des thromboisierten Hohlraums. Unterbindung und Durchschneidung der jug. int. an typ. Stelle. Weiterer Verlauf fieber- und beschwerdefrei. Entlassung am 20. 7. 1929.

12. Nanette P., 32 Jahre. Aufnahme 29. 4. 1926.

Anfangs März heftige Ohrschmerzen rechts, Hörvermögen schlecht. Seit 24. 4. Schwellung über dem rechten Warzenfortsatz. Am 29. 4. *Aufmeißelung*. Am 2. 6. wegen erneuter Schwellung und Klopfschmerzen 2. *Operation*: Äußere Sinuswand hochgradig verdickt, mit Auflagerungen besetzt, derb. Weil Erkrankung nur an einer Stelle, wird der Sinus nicht bis ins Gesunde freigelegt und gespalten. Am 4. 6. dringen aus unterem Sinusteil einige Tropfen Eiter. Am 6. 6. findet sich am unteren Sinusende größere Eitermenge. Da V. jug. int. druckschmerzhaft, wird sie freigelegt. Vom Bulbus her erfolgt bei Schlitzung keine Blutung, nur von der V. fac. Jug. wird *doppelt unterbunden*, durchschnitten, Lumen leer, geschlitzt, eingenäht. Abtragung der äußeren Sinuswand nicht möglich, da nur derber Wulst vorhanden, der nach innen nicht abzugrenzen ist. Weiterer Verlauf glatt.

Zusammenfassung.

Von den vorliegenden Fällen wurde bei Nr. 6, 7, 8, 9, 11 in der ersten Sitzung die Jugularis unterbunden und diese 5 Fälle hatten einen glatten Verlauf.

Bei Nr. 1, 2, 4, 5, 10 veranlaßte fortbestehendes oder erneut auftretendes Fieber eine Nachoperation, bei der die Jugularis unterbunden wurde. 4 Fälle hatten hierauf einen glatten Verlauf. Nur bei Nr. 2 waren wegen Fortschreitens der Thrombose noch weitere Nachoperationen notwendig. Bei Nr. 3 und 12 wurde die Jugularis bei der 2. Nachoperation unterbunden, beim Auftreten von Druckschmerz in der Jugularisgegend.

zu 2.

13. Josef Sch., 7 Jahre. Aufnahme 31. 10. 1935.

Ot. m. chron. rechts, seit 1 Woche Durchbruch hinter dem Ohr, Erbrechen, Schüttelfrost. 31. 10. *Radikaloperation*: Sinuspunktion ergibt übelriechendes Sekret. Schlitzung, worauf von oben starke Blutung, unten nicht. Entfernung eines großen z. T. zerfallenen Thr. V. jugularis blutleer. *Unterbindung des Venendreiecks und Abtragung*. 2. 11. Fieber infolge der Erreger im Blut, Schüttelfrost. *Nachoperation*: Bulbusfreilegung (aus ihm übelriechender Eiter) und Freilegung des oberen Abschnitts der Jug. int. (enthält keinen Thr.). Die Vene nach oben durchspült, fördert Eiter zu Tage. Der obere Venenabschnitt wird abgetragen, der untere belassen. 4. 11. Temp. 36,4, trockenes Hüfteln; über rechtem Unterlappen verstärktes Atemgeräusch, verkürzter Klopfschall, vereinzelte R. G.'s. Linkes Kniegelenk seit gestern sehr druckempfl., leicht geschwollen. Wunde septisch trocken. 5. 11. Wieder Schüttelfrost, Temp. 40,0, Puls rel. gut gefüllt. 6. 11. Wunde trocken, Bewußtsein erhalten, keine Meningitiszeichen. 7. 11. Auch linkes Hüftgelenk stark druckschmerzhaft. 8. 11. Übler Mundgeruch. Der gerufene Chirurg: Entzündung des Hüftgelenks mit Ausstrahlen der Schmerzen ins Knie. Patient ist sehr schwach. Zustand schlecht. 10. 11. Gestorben. Sektionsbefund: Fortschreitende eitrige Thrombose, viele verjauchte Lungenabszesse, eitrige Hüftgelenkmetastase links.

14. Anny O., 15 Jahre. Aufnahme 28. 1. 1935.

Pat., auswärts sinusoperiert, wird mit hoher Temperatur eingeliefert. Wunde septisch trocken. *Nachoperation*: Freilegung des Sinus sigm. Punktion neg. Eröffnung, Entfernung eines 6—8 cm langen nicht eitrigen Thrombus, Abtragung der äußeren Sinuswand. *Jugularisunterbindung* oberhalb des Abgangs der V. fac., da aus der Fac. Blut dringt, ebenso aus der Jug. comm. 2. 2. Temp. 38,2. Halswunde eitert, wird eröffnet. Man sieht die ganze harte thromboisierte Jug. comm. 2. *Nachoperation*: Freilegung der Comm. bis Schlüsselbein, der Fac. nach oben 5 cm, Stumpf der Interna, in deren Umgebung schmieriger Eiter

Abbindung und vollständige Abtragung der Comm. zu 4/5, der Fac. 3 cm lang. Bei Bulbusdurchspülung treten blutigeitrige Bröckel zutage. Bis 5. 2. hohes Fieber, ab 7. 2. kein wesentliches Fieber mehr. 13. 2. 1h Tod. 14. 2. *Sektion:* Fortschreitende vereiternde Thrombose im rechten Sinus transversus, keine Meningitis, Bauchwandabszesse rechts, sehr große verfettete Leber, kleine Milz, Ausscheidungsabszesse beider Nieren, Herz o. B.

15. Kaspar E., 56 Jahre. Aufnahme 15. 2. 1935.

Otitis med. chron. dextra. Seit August 1933 Ohreiterung, seit 8 Wochen Schläfenkopfschmerz, seit 8 Tagen Übelkeit, Brechreiz, Temp. 40,8. *Operation:* Sinusfreilegung, -Punktion neg. Schlitzung; es erscheint ein schwarzer Thrombus, der nach unten zu graurot aussieht. Die verdickte äußere Sinuswand wird herausgeschnitten. Bulbuswärts blutet es nicht; daher Jugularisfreilegung. Jug. oberhalb des Abgangs der Fac. zusammengefallen, darunter Jug. und Fac. prall gefüllt. Die Jug. wird oberhalb ihrer Teilung *unterbunden*, in die Haut eingenäht, durchschnitten. Hohlraum frei von Thromben.

19. 2. Temperatur über 40, ausgeprägte Meningitis!

21. 2. Temp. 41,3. Puls 130. Seit gestern abend Bewußtsein nicht mehr klar, zunehmender Kräfteverfall.

Gegen 1/212 Uhr Atemstillstand, Tod.

16. Martin H., 60 Jahre. Aufnahme 8. 5. 1934.

Anfangs Januar nach Erkältung Ohrschmerzen rechts, 8 Tage später Ohrlaufen, Nachlassen der Schmerzen.

Vor 4 Wochen Ohrspülungen durch prakt. Arzt, Aufhören der Eiterung, Verstärkung der Schmerzen. Seit 3 Wochen Drehschwindel bei Anstrengungen, seit 14 Tagen starke Schmerzen, vor 3 Tagen Schüttelfrost. *Operation:* Aufmeißelung rechts. Sinusfreilegung bis Bulbus, fühlt sich derb an, pulsiert nicht, Punktion neg. Bei Schlitzung tritt ein dicker schwarzroter Thr. zutage. *Unterbindung der Jug.* unterhalb des Abgangs der Fac. Wegen Anhaltens der Temp. *Nachoperation:* Thr. bis in die Nähe der Confluens fortgeschritten. Sinus wird weitere 4 cm geschlitzt, Wand sehr dick, kann daher nicht herausgeschnitten werden. Am

hinteren oberen Knie blutet es mittelmäßig, der Sin. petr. sup. blutet auch. 19. 5. Temp. 40,7. Ausgesprochene Meningitis. 20. 5. 8,15 h Tod.

Path. Befund: Erweiterung aller Herzhöhlen, geringe Hypertrophie des rechten Ventrikels. Ausgedehntes Lungenödem, hypoästatische Pneumonie der rechten Lunge, Lungenemphysem, chron. Bronchitis, Pulmonalsklerose, Stauung der Organe.

17. Fritz L., 7 Jahre. Aufnahme 1. 8. 1934.

Otitis med. ac. pur. links seit 3 Wochen, seit 8 Tagen 40,1 Fieberhöchstwerte, Schüttelfröste. *Operation:* Sin.-freilegung, Wand hart, mißfarben, Punktion neg., Schließung. Dabei dringt ein großer Thr. heraus. Operation wird wegen schlechten Herzbefunds abgebrochen. 2. 8. *Jug-Unterbindung.* Jug. int., Fac. ant., Jug. comm. sind mißfarben, hart, brüchig werden vollständig abgetragen. 4. 8. Sept.krankheitsbild: hohe Temp., Schüttelfrost Nackenstarre, Erbrechen, Kernig +.

14. 8. Wunde septisch trocken, ohne jede Reaktion, Knochen wie tot, nirgends Eiter, Kind leicht benommen. Starke Schlängelung der Bauchvenen (Cavathr.?) Marasmus. Lage aussichtslos. Kind wird nach Hause genommen, ist dort gestorben.

18. Elisabeth F., 5 Jahre. Aufnahme 18. 12. 1933.

Scharlachotitis seit 14 Tagen, hohe Temperaturen, Schüttelfröste, Erbrechen, 19. 12. *Operation:* Sinusfreilegung, -punktion neg., Schließung. Es tritt ein roter schon in Erweichung begriffener Thr. hervor, der in den Bulbus reicht. Jug.-freilegung. Sie fühlt sich wie ein kleinfingerdicker harter Strang an. Eröffnung fördert einen graurötlichen Thr. zutage. Nach dessen Entfernung von unten geringe, nicht normale Blutung. Schlechter A.Z. und Puls verbietet Thr. weiter abwärts zu verfolgen. *Jug. wird in Schlüsselbein-gegend unterbunden*, 3—4 cm abgetragen, oben in Hautwunde eingenäht. 23. 12. Freilegung des Jug.stumpfs bis zur Brustapparatur. Entfernung eines kleinen geruchlosen Thr., Blutung von unten, Unterbindung. — Schlechter A.Z., Temp. abwechselnd sehr hoch. 28. 12. Tod.

19. Hans F., 9 Jahre. Aufnahme 15. 12. 1931.

Ot. m. ac. pur. links, Schüttelfrost, Temp. 40,0, Zwangshaltung des Kopfs nach links zwingen am 16. 12. zur *Sinusfreilegung*. Sinus liegt linsengroß frei, zeigt rötliche Auflagerungen, ist weich, elastisch, pulsiert. Punktion ergibt Blut. Wegen Fortbestehens des hohen Fiebers am 9. 12. *Nachoperation*: Sinuseröffnung. In ihm findet sich ein schwarzroter Thr., aus Bulbus dringt ein mehr speckiger Thr. *Doppelte Unterbindung der Jug. int.* und Durchtrennung. Die sept. Temp. halten weiter an, auch die mening. Erscheinungen. 26. 12. Temp. 40,8. 1/28 h Tod.

20. Johann H., 60 Jahre. Aufnahme 18. 5. 1931.

Diabetes, Ot. m. ac. links, hohes Fieber veranlassen am 2. 6. *Sinusfreilegung*: Wand graugeblichweiß, kein Pulsieren, Punktion neg. Abtragung der äußeren Sinuswand. Im Sin. findet sich ein z. T. roter, z. T. schmierig zerfallener Thr. Auch im Sin. petr. sup. rote und schmierig zerfallene Thr. Jug. wird gesucht. Ein der *Jug. int.* nicht entsprechendes gänsekiel dickes Gefäß, das offenbar schon lange schlecht durchblutet war, wird *unterbunden*, ferner die *Fac. ant. u. Post.* 3. 6. Allmählicher Bewußtseinschwund, 5 h Tod.

21. Emil V., 23 Jahre. Aufnahme 9. 5. 1930.

Ot. m. chron. rechts, mit randständigem Durchbruch, vor 14 Tagen Schüttelfrost, Schwindelgefühl, Stirnkopfschmerz. 9. 5. *Radikaloperation*. Sinus sigm. parallelastisch, pulsiert, füllt sich beim Zusammendrücken der Jug. Temperaturabfall. 12. 5. wegen Temperaturanstiegs auf 41 *Nachoperation*: Sin. heute härter, keine Vorwölbung bei Druck auf Jug. Punktion neg. Bei der Eröffnung findet sich im Sinus sigm. ein bindegewebig organisierter Thr. von weißrosa Farbe, der mit der Wand verwachsen ist. Im oberen Teil des Sigm. im Transversus und im unteren Abschnitt finden sich frische rotgraue Thr., werden entfernt. *Jug.* wird anschließend oberhalb des Abgangs der *Fac. unterbunden*, nicht durchschnitten (oberhalb ist die Punktion neg., unterhalb ist die Jug. prall gefüllt). Wegen hohen Fiebers am 19. 5. 2. *Nachoperation*: Der Sin. transv. wird weiter-

geschlitzt. In ihm finden sich übelriechendes Sekret und zerfallene Thrombenmassen. Fortbestehen des sept. Krankheitsbildes. Am 24. 5. 5⁴⁵ Uhr Tod.

22. Georg Sch., 28 Jahre. Aufnahme 31. 10. 1927.

Ot. m. chron. pur., vor 3 Wochen Schüttelfrost, hohes Fieber, Ohrklopfschmerzen und -eitern, seit 8 Tagen Schwindel, heute früh Erbrechen, Schüttelfrost. *Operation*: Sinusfreilegung. Wand liegt linsengroß frei, ist verdickt, blau, pulsiert, derb. Punktion neg. Schlitzung: Die unteren $\frac{2}{3}$ des Sinus sind von rotem weichen Thr. gefüllt. Von seiten der Jug. keine Erscheinungen, wird daher nicht freigelegt. Da die Temperatur seit 6. 11. wieder hoch ist, am 11. 11. *Nachoperation*: *Jugularisunterbindung* oberhalb der Einmündung der Fac. comm., oberer Teil geschlitzt, in Wunde eingenäht. Anschneiden einer Schwellung über dem Steißbein; es entleert sich übelriechender Eiter. 13. 11. Durchspülung von Jug. bis Bulbus. 18. 11. Einschneiden zwischen Jug.wunde und Schnittwunde: aus 4 cm Tiefe wird Eiter entleert. Gegen Abend Atemlähmung, Tod.

23. Johann Sch., 33 Jahre. Aufnahme 3. 2. 1927.

Ot. m. chron. rechts, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen, Genick steif, druckempfindlich, starker Mundgeruch, verfallenes Aussehen. *Sinusfreilegung*. Wand wenig verdickt, elastisch, keine Pulsation. Punktion ergibt Blut. 5. 2. Aus Bulbus dringt plötzlich jauchiger Eiter. *Jugularisunterbindung* oberhalb der Einmündung der Fac. comm. Jug. ist in derben Strang umgewandelt, wird durchschnitten und geschlitzt. Im oberen Teil jauchiges Sekret, unterhalb der Unterbindung normal. Abtragung des mit bereits jauchig zerfallenem Thr. ausgefüllten Sinus. 10. 2. Pat., der sich verhältnismäßig wohl fühlt, hustet einen Eßlöffel Eiter aus, stemmt sich plötzlich auf, hustet $\frac{1}{2}$ Tasse hellroten schleimigen Bluts. Nach einigen Minuten Atemstillstand, Tod. Sektionsbefund: 2 Abszesse im rechten Oberlappen aus Bulbus viel Jauche, Jug.wunde frei. Im Sinus hinten oben $\frac{1}{2}$ cm langer erweichter Thr., sonst Sinus frei.

24. Konrad K., 27 Jahre. Aufnahme 4. 9. 1926.

Ot. m. chron. rechts, vor 4 Tagen heftige Ohrschmer-

zen rechts, Schüttelfrost. Sinusfreilegung. Sinus hart, pulsiert nicht, wird eröffnet; es findet sich im Sin. sigm. ein roter Thr., bulbuswärts leerer Hohlraum, von hinten her wird ein roter Thr. ausgepreßt, danach starke Blutung, aus Bulbus keine Blutung. Doppelte Jugularisunterbindung. Durchschneidung fördert von unten Blut, von oben nicht. Fortbestehen des hohen Fiebers. Am 9. 9. Kußmaulatmung, Tod. Leichendiagnose: Eitrige Meningitis in Kleinhirngegend, Kleinhirnanabszeß.

25. Josef Sch., 28 Jahre. Aufnahme 19. 12. 1926.

Ot. m. chron. rechts, seit 4 Tagen Ohrstechen, Kopfschmerz, Schüttelfrost, Schwindel beim Bücken, Brechreiz; an der Warzenfortsatzspitze heftige Druckschmerzhaftigkeit, auch Jug. im oberen Drittel druckempfindlich. Sinusfreilegung: Sinus oben elastisch, bulbuswärts weich, eine Stelle bereits durchbrochen. Abtragung der Sinuswand; in Sinusmitte findet sich ein verjauchter Thr., unten und oben je ein roter Thr. Jug. oberhalb Fac.-Einmündung zusammengefallen, unterbunden, bis in die Nähe des Bulbus freigelegt, an Sternocleidomast. angenäht. Jug. enthält roten Thr., von dem ein 5 cm langes Stück herausgezogen werden kann. Keine Besserung des Zustands, am 23. 12. Tod. Sektionsbefund: Kleinhirnherd, im Sinus kein Eiter.

Zusammenfassung.

Von den vorliegenden 13 Fällen war bei Nr. 15, 16, 19, 24 ausgeprägte Meningitis die Todesursache. Die Fälle Nr. 17, 18, 21, 22 bieten ein ausgeprägtes septisches Krankheitsbild, ebenso Nr. 18 (Meningitis u. Sepsis). Nr. 25 zeigt bei der Sektion einen Kleinhirnherd. Nr. 13, 14 und 23 erlagen einer Pyämie (metastatische Abszesse im Hüftgelenk, in der Bauchwand und der Lunge), Nr. 20 fortgeschrittener Thrombosierung.

In der 1. Sitzung wurde die Jugularis unterbunden bei Nr. 13, 15, 16, 18, 20, 24, 25. Bei Nr. 17 in der 2. Sitzung, weil die erste wegen Herzschwäche abgebrochen werden mußte. Bei Nr. 14, 19, 21, 22, 23 wurde die Jugularis in

der 2. Sitzung unterbunden, weil bei der 1. Operation keine Thrombose angenommen werden konnte (Sinus war augenscheinlich normal oder wenig verändert, Punktion ergab Blut).

Zu 3.

26. Hans E., 21 Jahre. Aufnahme 17. 8. 1935.

1929 hier links radikal operiert. Ot. m. chron. rechts mit Cholesteatom am 18. 8. Temp. zwischen 38 und 39, Kopfschmerzen rechts, kein Schüttelfrost, leichter Druckschmerz am Warzenteil, übelriechende Absonderung. Wegen Verdachts auf Sinusbeteiligung Radikaloperation rechts. Sinusfreilegung. Wand stark verdickt, mit Auflagerungen besetzt. Weitere Freilegung; Punktion ergibt kein Blut, Eröffnung: es findet sich ein großer roter Thrombus, nach dessen Entfernung es auch von unten stark blutet. Daher zunächst keine Jugularisunterbindung. Abtragen der äußeren Sinuswand. Tamponade. Fieber- und beschwerdefreier Verlauf. Entlassung am 3. 10. 1935.

27. Anna K., 33 Jahre. Aufnahme 3. 6. 1935.

Ot. m. ac. rechts. zwingt am 3. 6. zur Aufmeißelung. Wegen Schüttelfrost und 40,0 Temp. am 6. 6. 1935 Nachoperation: Sin.-freilegung, Punktion ergibt Blut. Kein Temperaturabfall. Am 8. 6. erneute Sinuspunktion: ergibt Blut, deshalb keine Jugularisunterbindung. 10. 6. Sehr schlechter A.Z., hohes Fieber, sept. Hautausschlag des Gesichts. Erneute Sinuspunktion ergibt Blut. Auf Wunsch des Ehemanns gegen ärztlichen Rat entlassen. 18. 8. Nachschau. Pat. gibt an, sie habe noch 3 Wochen Erbrechen gehabt, dann Wohlbefinden. Jetzt ist sie o. B.

28. Babette G., 35 Jahre. Aufnahme 10. 1. 1935.

Wegen plötzlicher Druckschmerzen und Klopfen Aufmeißelung links. Der Sinus zeigt keine krankhaften Veränderungen, ist gefüllt, pulsiert; daher keine Punktion. Am 12. 1. wegen Temperaturanstiegs auf 39,1 Sinusfreilegung; mehrfache Punktion ergibt Blut. Man hat die Empfindung, daß eine randständige Thrombose vorliegt, da aus den Stichkanälen kein Blut nachdrängt. Sinus wird

geschließt, es erfolgt stärkere Blutung. Daher vorerst keine Jugularisunterbindung. Weiterer Verlauf fieber- und beschwerdefrei. Am 28. 2. 35 Entlassung, (Verlegung in die Frauenklinik zur Behandlung eines kleinkindskopfgroßen Beckentumors).

29. Bernhard T., 4 Jahre. Aufnahme 5. 11. 1934.

Maßernotitis zwingt wegen pyämischer Temperaturen am 8. 11. 34 zur Aufmeißelung beiderseits. Es werden keinerlei Anzeichen einer Sinusthrombose gefunden. Die Temp. fällt allmählich ab und Pat. kann gesund entlassen werden.

30. Peter F., 14 Jahre. Aufnahme 15. 10. 1933.

Taubstumm, ot. m. chron. links, seit 4 Tagen starke reißende Schmerzen im linken Ohr und Fieber, Nackensteifigkeit, gestern Erbrechen, übelriechendes Sekret im linken Gehörgang. Sinusfreilegung: Sinus pulsiert, Punktion positiv; doch man hat den Eindruck einer randständigen Thrombose. Am 18. 10. wegen fortbestehender hoher Temp. erneute Sin.-punktion, 3 mal neg. Eröffnung und teilweise Entfernung der Sinuswand. Ausräumung eines Thrombus worauf Blutung erfolgt. Weiterer Verlauf o.B. Am 1. 11. Anginaanfall, glatter Verlauf. Am 30. 11. Nachschau: o. B. guter A.Z.

31. Georg Sch., 54 Jahre. Aufnahme 10. 10. 1933.

April 35. Mittelohrentzündung, seither Gehör schlechter. Seit Anfang September stinkende Absonderung aus linkem Ohr, seit 3 Wochen klopfende Schmerzen, seit 14 Tagen Schläfenkopfschmerz links, seit 8 Tagen öfters Schüttelfrostspannende Kopfschmerzen. Herabgesetzter K. u. E. Z. Am 12. 10. Aufmeißelung: Der Sinus liegt frei; es wird aus ihm ein roter morcher Thrombus entfernt, worauf Blutung erfolgt Verlauf und Temp. normal. Am 6. 11. Entlassung.

32. Heinrich N., 48 Jahre. Aufnahme 28. 5. 1931.

Ot. m. ac. pur. rechts, starke Kopfschmerzen veranlassen am 29. 5. Aufmeißelung: Sinusfreilegung, Punktion pos. da jedoch sehr wenig Blut zu bekommen ist, liegt entweder eine starke Wandverdickung oder eine randständige Thrombose vor. Verlauf fieber- und beschwerdefrei.

33. Babette W., 25. Jahre. Aufnahme 6. 3. 1931.

Ot. m. ac. pur. links zwingt am 21. 3. zur Sinusfreilegung wegen Schüttelfrost und hohen Temp. Der Sinus ist jedoch prallelastisch, pulsiert. Am 27. 3. wegen erneuter hoher Temp. Nachoperation: Sinuspunktion ergibt kein Blut. Abtragung der äußeren Sinuswand. Oben erfolgt starke, von unten schwache Blutung. Aus dem oberen Ende des Bulbus wird ein schwarzer Thrombus entfernt, worauf die Blutung stärker wird. Glatter Verlauf. Am 8. 5. zur ambulanten Nachschau entlassen.

34. Konrad F., 15 Jahre. Aufnahme 16. 7. 1930.

Ot. m. chron. links mit Durchbruch der Membrana Shrapnelli, Cholesteatom; seit etwa 14 Tagen im linken Hinterkopf reißende Schmerzen, beim Bücken Schwindelgefühl, seit 8 Tagen oft Erbrechen, letzte Nacht Schüttelfrost; Schwellung und starke Druckempfindlichkeit hinter dem linken Ohr; man glaubt eine Wellenbewegung zu spüren. Am 16. 7. Operation: der (Sinus sigm.) ist nicht zu sehen, da er durch eine alte Thrombose verschlossen oder wegen Auflagerungen von der Umgebung nicht zu unterscheiden ist. 2-malige Punktion erfolglos. Weiterer Verlauf fieber- und beschwerdefrei. Entlassung am 6. 9. 1930.

Stefan B., 29 Jahre. Aufnahme 20. 11. 1928.

Ot. m. ac. links, vor 7 Wochen geringe Schmerzen, Klopfen, Ausfluß aus dem linken Ohr; seit 8 Tagen starke Kopfschmerzen; Weichteile über Warzenteil geschwollen, Spitze und Venenkanal druckempfindlich, im Gehörgang schleimig eitriges Sekret. Am 27. 11. Sinusfreilegung. Es wird ein perisinuöser Abszeß entleert; Sinus derb, 2-malige Punktion ergibt kein Blut, Sinus wird geschliffen, aus Bulbusgegend werden Thrombenmassen entfernt, darauf schwache Blutung. Von oben her wird ein großer Thrombus entfernt, darauf starke Blutung. Beschwerdefreier Verlauf, am 23. 1. 1929 entlassen.

36. Kunigunde B., 46 Jahre. Aufnahme 31. 12. 1927.

Anfang Oktober 1927 im linken Ohr nach Erkältung Schmerzen, tags darauf Eiterung, seit 14 Tagen Verstärkung der Schmerzen, die letzten beiden Nächte wegen starken

Stechens Schlaflosigkeit; Gehör links sehr schlecht. Am 2. 1. Aufmeißelung: Sinus blaurot, derb, keine Pulsation, Punktion neg. Sin. wird geschlitt, ein Thrombus, so groß wie der freiliegende Sinus, entfernt, worauf es von oben blutet, aus Bulbusgegend nicht. Fieber- und beschwerdefreier Verlauf, am 4. 2. 28 Entlassung.

37. Lorenz G., 6 Jahre. Aufnahme 19. 8. 1927.

Ot. m. ac. pur. rechts, Schädelbruch; Angabe des einweisenden Arztes: Anfangs Juni nach 2 tägigen Schmerzen aus linkem Ohr eitriges Ausfluß, 3 Tage lang. Pat. fiel am 12. 8. die Treppe herunter auf den Kopf, blutete aus Nase und Ohren, 1 std. Erbrechen. Am nächsten Tag starke Ohrschmerzen rechts. Wegen Fieber und Kopfschmerzen am 9. 9. Sinusfreilegung: Sin. derb, pulsiert nicht, Wand verdickt, blaugraurötliche Farbe. Punktion neg. Abtragung der äußeren Wand. Mit bloßem Auge kein Thrombus mehr feststellbar. Weiterer Verlauf glatt. Entlassung am 23. 10. 1927.

38. Georg H., 46 Jahre. Aufnahme 6. 1. 1927.

Ot. m. ac. rechts, seit vorgestern starke rechtsseitige Kopfschmerzen, Klopfen und Stechen im rechten Ohr. 8. 1. Druckempfindlichkeit an der Spitze. 12. 1. Stechen im rechten Ohr, Schüttelfrost. 13. 1. Aufmeißelung: o. B. Wegen hoher Temperaturen am 31. 1. Nachoperation: Sinusfreilegung, äußere Wand stark verdickt, Mitte durchlöchert, woraus blutig-schleimig-eitriges-fadenziehendes Sekret fließt. Abtragen der Sinuswand, von hinten oben wird ein roter derber Thr. entfernt, worauf starke Blutung eintritt; aus Bulbus keine Blutung. 3. 2. Verbandswechsel: Jugularisgegend nicht druckempfindlich, kein Fieber, keine Schmerzen. 12. 3. Nach glattem weiteren Verlauf zur ambulanten Behandlung entlassen.

39. Hedwig K., 36 Jahre. Aufnahme 10. 11. 1927.

Ot. m. ac. perf. links, seit 5 Wochen Schmerzen und Klopfen im linken Ohr; Schläfenkopfschmerz und Hinterkopfschmerz. Ganzer Warzenteil druckempfindlich, bes. über Venenkanal, Fieber, daher Sinusfreilegung: äußere Wand rötlich, derb, mit Auflagerungen belegt, keine Pul-

sation, auch nicht bei Druck auf Jugularis, Punktion ergibt kein Blut. Schlitzen der Sinuswand. Der ganze Sinus ist mit einem organisierten, weißlichen Thrombus ausgefüllt. Bis 27. 11. glatter Verlauf. Am 27. 11. wird am Nacken ein Eiterherd entleert. Am 6. 12. wegen ausgedehnter Wellenbewegung nochmalige Operation: da nichts krankhaftes gefunden, Operation abgebrochen. Weiterer Verlauf fieberfrei, am 9. 1. 28 entlassen.

Zusammenfassung.

Von den vorliegenden 14 Fällen wurden bei Nr. 26, 30, 31, 35 bei Nr. 33 und 38 bei der Nachoperation wegen Fiebers aus dem Sinus Thromben entfernt. Die Jugularis wurde nicht unterbunden, da nach der Thrombenentfernung stärkere Blutung erfolgte. Die Fälle hatten einen glatten Verlauf; ebenso Fall 36, obgleich bei dem nach der Thrombenentfernung keine Blutung eintrat. Bei Nr. 28, 32, 37 lag sehr wahrscheinlich randständige Thrombose vor, die jedoch mit bloßem Auge nicht nachweisbar war; bei 39 wurde ein organisierter weißlicher Thrombus gefunden, bei 34 eine alte geschlossene Thrombose. Ohne daß die Jugularisunterbindung in Erwägung gezogen wurde, heilten diese Fälle schnell, ebenso Fall 29, bei dem pyämische Temperaturen, aber keine Anzeichen einer Thrombose bestanden. Nr. 27 mit Allgemeininfektion ohne Thrombose, in hoffnungslosem Zustand heimgeholt, gesundet nach angeblich 3 Wochen langen Fortbestehen des Erbrechens!

Zu 4.

40. Michael G., 67 Jahre. Aufnahme 4. 5. 1932.

Otitis media acuta simplex. Seit 3 Wochen zunehmende Kopfschmerzen, seit 3 Tagen Schwindel, linker Arm gelähmt, kann kaum gehen. 4. 5. Bewußtseinsverlust, schwere klonische und tonische Krämpfe. Aufmeißelung: Sinus sigmoideus freigelegt, ist von derben roten Auflagerungen bedeckt, pulsiert nicht, fühlt sich hart an, an der seitlichen Wand durchbrochen. Sinus wird bis Bulbusnähe freigelegt, Wand o. B., fühlt sich hart an, pulsiert nicht.

Punktion ergibt kein Blut. Schlitzung: Wand 1—1½ cm dick, Hohlraum stricknadeldünn, geschlossen durch rosa-weißlichen, also bindegewebig organisierten Thrombus. Daher keine Jugularisunterbindung. Abtragung der seitlichen Sinuswand. Keine Besserung des Zustands. Am 13. 5. unter Atemlähmung Tod ¼6 Uhr. Path. Befund: Eitr. Sin.-Thr. Ausgedehnte eitrige Leptomeningitis.

41. Johann Sch., 47 Jahre. Aufnahme 14. 6. 1930.

Ot. m. ac. simpl.; seit 8 Tagen Benommenheit, Schwindel, Unsicherheit beim Gehen und Stehen. 14. 6. Operation: Sin-freilegung. Sinus pulsiert nicht, Wand derb. Punktion neg. Abtragung der Wand. Knie bis Bulbus ausgefüllt von derben organisierten Thrombus. Punktion eines Kleinhirnabszesses. 16. 6. A.Z. schlecht, Temp. 39,0, Luftröhrenrasseln; nachts Bewußtlosigkeit, völlig sterbender Zustand 17. 6. 30 10 h Tod. Sektionbefund: Beide V. jugulares leer.

42. Hans R., 18 Jahre. Aufnahme 29. 10. 1929.

Ot. m. chron. sinistra; seit 4 Wochen Klopfen im Ohr, seit 2 Tagen Schwindel und Schüttelfrost. 30. 10. Sinusfreilegung: normales Aussehen, wird nicht punktiert, da deutliche Wellenbewegung. Jugularisgegend nicht druckempf. In den folgenden Tagen ausgesprochen septisches Krankheitsbild. 15. 11. 1¼ Uhr Tod. Sektionsbefund: Allgemeininfektion, keine Thrombose; Gelenkmetastasen, Pleuritis fibrinosa, geschwürige Endocarditis der Mitralklappen, Herzmuskelabszesse in den Papillarmuskeln, Niereninfarkt, trübe Schwellung der Leber, sept. Milztumor, sept. Geschwüre an den Darmchlingen, Blutungen der Blasen-schleimhaut.

43. Konrad R., 58 Jahre. Aufnahme 2. 10. 1928.

Ohne bekannte Ursache vor 7 Wochen Klopfen im rechten Ohr, Schwerhörigkeit, Stirnkopfschmerz: 3. 10 28 leichtes Frösteln. 11. 10. Sinusfreilegung: In Bulbusgegend Wand von Auflagerungen besetzt, etwas verdickt, derb, pulsiert nicht Druck gegen Jugularis füllt den Sinus nicht. Punktion neg. Abtragung der Wand; es findet sich ein roter derber Thrombus. Nach gutem Befinden am 22. 10. wegen Temperaturanstiegs auf 40,2 Nachoperation: Sinus

sup. verfolgt und aus ihm ein 2 cm langer derber roter Thr. entfernt. Keine Jug.-Unterbindung, da Jug.-Gegend nicht geschwollen oder druckempfl. Unter Fortbestehen der hohen Temp. und Nachlassen der Herzkraft am 30. 10. Tod. Sektionsbefund: Es wird kein Thr., kein Eiter gefunden. Jugularis vollständig normal.

44. Michael B., 25 Jahre. Aufnahme 13. 7. 1927.

Seit 1 Jahr Ausfluß aus dem rechten Ohr ohne Schmerzen, 16. 7. auf Wunsch entlassen. 24. 7. Neuaufnahme. Am 1. Tag nach der Entlassung Erbrechen, heute auf der Fahrt Schüttelfrost. Sinusfreilegung: Sin. parallelförmig, pulsiert nicht deutlich. Punktion ergibt Blut, doch blutet es aus der Stichöffnung nicht. Randständige Thrombose? Jug. nicht druckempfl. Nach Fortbestehen der sept. Temp. am 31. 7. Tod. Sektionsbefund: Doppelseitige Pleuritis exsudativa. Lungenabszeß im linken Oberlappen.

45. Elfe G., 3 Jahre. Aufnahme 23. 5. 1927.

Vor 1 Jahr Ohreiterung links; seit 8 Tagen erneut Eiterung aus dem linken Ohr. Befund: Am Warzenteil nach der Spitze zu ausgedehnte Schwellung und Druckschmerzhaftigkeit. Operation: Sinus wird bei der Operation angeätzt; es blutet aus ihm stark. 25. 5. Nackenstarre, Kernig ++. 26. Bei Verbandswechsel Sin. punktiert: neg. eröffnet, ein frischer roter Thr. entfernt. 27. 5. Tod.

46. Adam K., 32 Jahre. Aufnahme 7. 1. 1927.

Ot. m. chron. links; seit 12 Tagen heftige Kopfschmerzen und starkes Klopfen im Ohr; letzte Nacht Schüttelfrost, Erbrechen. 9. 1. Sinusfreilegung: Punktion neg.: Abtragung der Wand bis zum Bulbus. Sinus enthält einen zerfallenen geruchlosen Thr. Aus dem Bulbus blutet es nach Entfernung der Thrombenmassen nicht. Jug. nicht druckempfl. daher keine Unterbindung. 18. 1. nach Fortbestehen der hohen Temp. Tod. Leichendiagnose: Meningitis.

47. Fritz St., 19 Jahre. Aufnahme 22. 8. 1927.

Seit 3 Wochen schlechtes Hörvermögen links. Wird sterbend eingeliefert. Herzstillstand während der Operation. Inzwischen Sinus eröffnet, von organisiertem Thr. ausgefüllt.

48. Johann W., 36 Jahre. Aufnahme 8. 7. 1926.

16. 1. nach Schnupfen Ohrenschmerzen rechts, Parazentese. Anfang Februar Schläfenkopfschmerzen. Mitte März Aufhören der Ohreiterung. Vor 4 Wochen wieder Ausfluß, in den letzten 8 Tagen appetitlos, Erbrechen, Kopfschmerzen. 12. 7. Sinusfreilegung: Glatte Wand, deutliche Pulsation, derb. Punktion neg. Schlitzen und Abtragen der seitlichen Wand. Im Sin. blaß-blau-roter organisierter Thr. Keine Besserung des Zustands, Tod am 31. 7. 1926. Obduktionsbefund: Eitrige Meningitis.

Zusammenfassung.

Von den vorliegenden 9 Fällen ergab die Sektion bei Nr. 40, 46, 48 ausgeprochene Meningitis, welche auch bei Nr. 45 zum Tod führte.

Nr. 47 wurde sterbend eingeliefert.

Der Obduktionsbefund bei Nr. 42 zeigte ausgeprägte Sepsis und Pyämie, bei Nr. 44 einen Lungenabszeß; Nr. 41 zeigt einen Kleinhirnabszeß, Nr. 43 im Sinus sup. fortgeschrittene Thrombose.

Die Jugularis wurde nicht unterbunden, weil bei Nr. 47 während der Sinuseröffnung bereits der Tod eintrat, bei 40, 41, 47 schon organisierte Thrombose, bei 44 (Punktion pos.) höchstens geringe randständige Thrombose vorlag; ferner bei 42 Sepsis und Pyämie ohne Thrombose (Sinus wegen normalen Aussehens nicht punktiert), bei frischer Thrombose bei 43 und 45 keine Unterbindung, da keine Anzeichen einer Jugularisbeteiligung vorhanden waren, bei 46 ebenfalls nicht, trotzdem es nach Entfernung der zerfallenen Thrombosenmassen nicht blutete!

Es folgen schließlich die 2 statistisch nicht erfaßbaren Fälle: Nr. 49 Jugularis noch unterhalb des Schlüsselbeins abwärts thrombosiert; in hoffnungslosem Zustand heimgeholt. dort wahrscheinlich gestorben.

Nr. 50. Keine Jugularisunterbindung, obgleich im Sinus ein weicher Thrombus gefunden wird, gegen ärztlichen Rat vorzeitig entlassen.

49. Heinrich Sch., 60 Jahre. Aufnahme 21. 2. 1927.

Seit 8 Wochen Stirnkopfschmerzen, seit 5 Wochen Ohrlaufen rechts. 24. 2. Sinusfreilegung: Wand verdickt und mit Auflagerungen besetzt. Sinus derb, pulsiert nicht, Punktion ergibt kein Blut. Abtragung der äußeren Sinuswand, die auf mehrere mm verdickt ist. Der Sinus ist leer: bulbuswärts finden sich Thrombofen, werden ausgeräumt. Anschließend Jugularisunterbindung. In Höhe des Schildknorpelrands ist in der Jug. ein Loch, aus dem von oben her reichlich Eiter quillt. Freipräparieren der Jug. bis unter das Schlüsselbein, nach oben bis Bulbusnähe. Jug. oberhalb des Schlüsselbeines durchschnitten und in den unteren Wundwinkel eingenäht. Der Jug.-Stumpf enthält einen z. T. schon organisierten Thr. Weitere Operation wegen allgemeiner Schwäche aufgegeben. Pat. wird am 11. 3. von den Angehörigen nach Hause geholt.

50. Georg St., 2 1/2 Jahre. Aufnahme 9. 9. 1927.

Scharlachotitis zwingt am 16. 9. zur Sinusfreilegung: Wand zeigt rötliche Granulationen, Bulbus normales Aussehen, pulsiert nicht, 2x punktiert ohne Erfolg. Abtragen der äußeren Sinuswand. Sinus enthält ziemlich weichen graurötlichen Thr. Weiterer Verlauf ohne Besonderheiten. Am 5. 11. Entlassung auf Drängen der Eltern. 16. 3. 1928. Seit Entlassung eitert die Wunde ununterbrochen! Aufnahme auf eigene Verantwortung abgelehnt.

III. Überblick über das Schrifttum der Jahre 1933, 34, 35.

Dixon, O. Jason: Die Unterbindung der V. Jug. bei Thrombophlebitis hat nichts mit ev. Heilung zu tun. Wilson, W. Frank: Entscheidet bezüglich der Jug. unterbindung von Fall zu Fall, da er wie B. Glanson und Lewis Fisher auch ohne Unterbindung erstaunlich gute Ergebnisse gesehen hat.

Popper J., berichtet über einen Fall von Jug.-Lig. mit nachfolgender außergewöhnlich schwerer Sehstörung, hochgradiger Stauungspapille und beiderseitiger Abducenslähmung. Aussprache: Neumann, Da er bei der großen Anzahl von Jug.-Unterbindungen, die er bis jetzt vorge-

nommen, niemals eine derartige Schädigung des Sehner-ven gesehen hat, glaubt er, daß man daran denken muß, daß möglicherweise eine andere Ursache hier mitgewirkt hat (Regelwidrigkeiten im Venensystem). Die Anzeige zur Jug.-Unterbindung muß äußerst streng aufgefaßt werden, zumindest muß aber bei der vorbeugenden Unterbindung allergrößte Vorsicht walten. Merzschick stimmt N. zu bez. Jugularisunterbindung. Er ist diesem vorsichtigen Standpunkt treu geblieben und hat die Jug. nicht grundsätzlich unterbunden.

Hofmann berichtet über einen Fall von Sinus- und Bulbusthr. nach ak. Ot. Langwieriger Verlauf. Ausdehnung der Thr. bis in den Sin. der andern Seite. Metastase in der Bauchwandmuskulatur. Heilung. Interessant ist die Aussprache Urbantschitsch: In einem Fall, bei dem er das Ende der Thr. bei der Operation nicht erreicht, klemmte er die Jug. der andern Seite ab. Durch den hiedurch erreichten starken Druck im Gefäßsystem des Schädels wurde der Thr. tatsächlich ausgeschleudert, der Pat. genas.

Fröding, C. A., hat in den Jahren 1926—31 die Fälle von Sin.-Thr. im Sabbatsberg Sjukhus bearbeitet. Behandlungsgrundsätze: Bei klinischen Anzeichen von S.-Thr.: Mastoidektomie und S.-freilegung Sin. nicht verändert: nichts. Wiederholen sich die klin. Anzeichen oder ist der Sin. verdächtig, Eröffnung: Keine oder geringe Blutung: Jug.-Unterbindung, weitgehende Spaltung, gangränöse Wand abgetragen. Von 61 S.-Thr. 51 Sin.-Spaltungen und Jug.-Unterbindungen: 75% Heilung. 89,3% Heilung, wenn Fälle von Meningitis (10) und Absz. cerebri (3) abgezogen werden. Vergleicht die Resultate mit S. H. Myginds: 1915—22: 98 F. oper. 55% Heilung, 1923—30: 101 F. konserv. 71% Heilung. Kovers, A.: referiert über 5 F. und gibt an: Jug. Lig.: 1. wenn Jug. selbst ergriffen, 2. bei primärer oder sekundärer verstopfender Bulbusthr. mit ersten Allgemeiner-scheinungen, 3. wenn unterer Teil des Thr erreicht, jedoch wegen Blutung vom Bulbus her nicht entfernt werden kann, 4. bei wandständiger Thrombose mit ersten Allgemeiner-scheinungen ohne Anzeichen zur Selbstheilung.

Almour, R.: Angaben des Heilungsprozentes mit J.U. schwanken von 0—85, ohne: 25—100. — J.U.: 1. wenn nach Sin.Eröffnung keine freie Blutung von unten, 2. Schüttelfrost, pos. Blutprobe, schnell zunehmende Blutarmut, 3. Thr. eitrig, Sin. nekrotisch, Zeichen von Allgemeininfektion. 4. Wandständige Thr. und Allgemeininfektion.

Eljasson, M.: erklärt auf Grund statist. Ergebnisse und alltäglicher Beobachtungen die J.U. für empfehlenswert, aber unter gewissen Bedingungen.

Krepuska, G.: Budapester Univ.-Ohren-Klinik: Unter 14 Fällen mit reiner Bulbusthr. starben 2, bei denen J.U. unterlassen wurde, die übrigen mit J.U. heilten. Von 17 Fällen von Bulbusthr., erschwert durch Hals- und paravertebralen Abszessen, heilten 13 mit J.U., 4 ohne J.U. starben. Bei keinem seiner 166 Kranken mit J.U. irgendwelche Schädigung wahrgenommen. Anzeige zur J.U.: 1. nachgewiesene Thrombophlebitis der Jug., auch ohne schwere klin. Erscheinungen, 2. präjugulare Phlegmone, Abszeß unmittelbar oberhalb des Schlüsselbeins, 3. Thr.-Phleb. der Jug. 5. Immer wiederkehrende Allgemeininfektion, auch bei scheinbar unverändertem Sin. Jug. ist vor Sin.Operation zu unterbinden bei 1.—4. und nachoper., wo sich die Sin.Phleb. nach der vorherigen Antrotomie entwickelt. Unterbindung während der Operation, doch vor Sin.Op.: 1. bei geschwüriger Sin.Phleb., 2. bei zerf. Thr. von großer Ausdehnung, 3. bei Sin.Verletzung, 4. bei Sin.Blutung. Heilungsziffer —1926 = 295 F.: 66,7%; 1927—32 = 56 F.: 71,4%. Die F. mit intrakranieller Komplikation abgezogen: 74,8% bzw. 83,3%.

Krepuska, St.: 73 F. der Univ.-Ohrenklinik Budapest (davon nur 3 F. primärer schwieriger Bulbusthr.) heilten 39 F. (53,4%), ohne J.U. 21 (starben 29), mit J.U. 18 (starben 5). Die Jug.Unterbindung ist also grundsätzlich zu fordern; sie wurde auch nur bei aussichtslosen Fällen unterlassen.

Tato, J. M.: Ein Fall von Mastoiditis u. Thr. in der 2. Woche einer Ot. Roter Thr. an sich schließt eine Infektion nicht aus. Das klin. Bild muß die Behandlung leiten,

welche frühzeitig sein muß. J.U. muß ausgeführt werden und man soll die Enden der Thr. immer auffuchen.

Portmann, G.: steht auf dem Standpunkt, daß jede vom Ohr ausgehende Sinuserkrankung entweder durch J.U., durch Ausräumung des Sin., Tamponade und Unterbindung oder durch Heraus-schneiden der Jug. anzugreifen ist. Seit 8 Jahren hat er mit dieser Behandlung keinen Pat. verloren.

Feuz, J.: Regeln der Portmann'schen Klinik in Bordeaux: Ohne Zeichen einer Ausfaat in die Blutbahn kein Eingriff am Sin.; beim 1. Zeichen sofort J.U. und breite Eröffnung des Sin., 10 F. in 4 Jahren nach diesem Grundsatz geheilt. 8 konserv. beh. F.: 60% Heilung, bei Blutübertragung. Sofortiges Eingreifen ist weniger gefährlich; stützt sich auf 3 spätoperierte ungünstig verlaufene F. Vorbeugende Oper. nach Portmann z. Z. das Richtige, daneben Blutübertragung.

Dill, J. L.: Gesichtspunkte für die Operation: In der Regel Sin. freigelegt, eröffnet, Thr. entfernt und J.U. Wenn kein sept. Fieber, nach breiter Eröffnung des meist bestehenden perisin. Absz. zunächst zuzuwarten, ohne den thrombos. Sin. zu punktieren oder eröffnen. Meist aber J.U. Heilungsaussichten trotzdem nicht schlechter.

Frühwald: J.U. kann Metastasen nicht verhindern.

Humbert, C.: Prognose einer vom Ohr ausgehenden Streptokokkensepsis nicht unbedingt schlecht, keine J.U., wenn keine Anzeichen eines Thr.-weiter-schreitens.

Mormura, S.: Erkennen der Sin.Thr.: Zunahme der Urobilinogenreaktion des Harns. Nimmt die Ubgr. nach Sin.spaltung zu, dann J.U.

Schneck, G. P.: Besser J.U. vor Sin.Oper., um Verschleppung von Erregern und Thr.-Teilen zu verhindern.

Neumann: empfiehlt: Temp. hoch, Blutprobe +:

1. Doppelte J.U. unterhalb des Eintritts der V. fac. comm.
2. Abtragen der vorderen Wand des Sin. sigm. und Tamponade.

IV. Schlußbetrachtung.

Das Schrifttum der letzten 3 Jahre zeigt, wie geteilt die Ansichten über die Anzeigestellung zur Jugularisuntersuchung sind.

Abgesehen von Dixon und Jason, die sich von der Jugularisunterbindung überhaupt nichts versprechen, sind Wilson, Frank, Glanston, Fisher, Neumann und Merzdick Gegner der grundsätzlichen Jugularisunterbindung.

Nach Frühwald kann die Jugularisunterbindung Metastasen nicht verhindern. Humbert ist bei Allgemeininfektion ohne Thrombose gegen die Jugularisunterbindung. Bemerkenswert ist Urbantschitsch's Bericht über seinen Erfolg durch Abklemmung der Jugularis der andern Seite; ferner Mormura's Thrombose-Erkennung mittels der Urobilinogenreaktion.

Fröding, Kovers, Almour, Eljasson sprechen für Jugularisunterbindung unter gewissen Bestimmungen, geben Richtlinien, wann Jugularisunterbindung angezeigt ist.

G. und St. Krepuska weisen statistisch ihre Erfolge bei Jugularisunterbindung nach, sind wie Tato, Portmann und Dill für grundsätzliche Unterbindung, Schneek ist für Unterbindung noch vor der Sinusoperation, auch Neumann bei Fieber und positiver Blutkultur.

Der nachgewiesene Erfolg bei grundsätzlicher Jugularisunterbindung, das Nichtauftreten irgendwelcher Schädigungen nach der Unterbindung (der eine Fall nach Popper's Bericht mit Sehstörung infolge der Unterbindung wird angezweifelt, kann nicht verallgemeinert werden) zwingt, die grundsätzliche Unterbindung zu fordern.

Beurteilung der Beobachtungen aus der Erlanger Klinik.

Von den 9 gestorbenen Fällen ohne Jugularisunterbindung wäre bei Nr. 46 (keine Blutung nach der Thrombenentfernung aus dem Sinus von unten) die Unterbindung jedenfalls angezeigt gewesen; auch bei 43 und 45 (frische Thromben, Blutung) wäre die Unterbindung kein Fehler gewesen. Die übrigen Fälle zeigten schon derart fortgeschrittene zum Teil organisierte Thrombose, daß auch die Unterbindung den Verlauf kaum mehr geän-

dert hätte; höchstens bei 42 (Allgemeininfektion ohne Thrombose) und 44 (Allgemeininfektion mit vermutlich randständiger Thrombose) hätten durch frühzeitige Unterbindung Metastasen verhindert und dadurch das Leben gerettet werden können.

Von den 14 geheilten Fällen ohne Jugularisunterbindung wurde bei 36, obwohl nach Sinusclittung und Thrombenentfernung vom Bulbus her keine Blutung eintrat, die Unterbindung nicht für notwendig erachtet, auch nicht bei 26, 30, 31, 33, 35, 38, da es bei diesen Fällen nach Thrombenentfernung blutete; ferner wurde bei 28, 32, 37 keine Unterbindung vorgenommen, da die Sinuspunktion Blut ergab (aus den Stichstellen blutete es jedoch nicht) und sich eine randständige Thrombose annehmen, aber nicht sicher erkennen ließ. Bei 27 und 29 (Allgemeininfektion ohne Thrombose) wurde trotz Fortbestehens hohen Fiebers nicht unterbunden, bei 34 und 39 nicht, da eine alte organisierte Thrombose vorlag. Diese Fälle verliefen verhältnismäßig glatt und leicht. Sicher konnte man sich jedoch nicht sein, ob nicht bei dem einen oder andern Fall weiterreichende Thrombose, Überschwemmung des Körpers mit Erregern und Giftstoffen einen ungünstigen Ausgang bewirkt hätten. Mit der Jugularisunterbindung bei der Nachoperation bei erneut auftretendem Fieber und Druckempfindlichkeit der Jugularisgegend kommt man erfahrungsgemäß häufig zu spät, da der Körper dann bereits mit Erregern und Giftstoffen überschwemmt ist und Metastasen eingetreten sind. In den vorliegenden Fällen hätte daher die Unterbindung meiner Ansicht nach in der Mehrzahl der Fälle vorgenommen werden können. Nur bei den Fällen mit alter organisierter Thrombose wäre die Unterbindung zwecklos gewesen.

Von den 13 gestorbenen Fällen mit Jugularisunterbindung starben 4 an ausgeprägter Meningitis; die übrigen zeigten teils weit fortgeschrittene Thrombose, teils Überschwemmungen des Blutes mit Giftstoffen, mit Erregern und Metastasen. Bei den Fällen, bei denen erst bei der Nachoperation die Jugularis unterbunden wurde, war bei

der ersten Operation noch kein Anhaltspunkt einer Sinus-thrombose vorhanden. (Der Sinus zeigte normales Aussehen, die Punktion ergab Blut). Die Unterbindung kam zu spät, ohne daß durch etwaiges Hinauszögern der Unterbindung eigenes Verschulden vorlag; der Körper der Kranken war bereits mit Giftstoffen und Erregern überschwemmt, als die Notwendigkeit der Unterbindung erkannt werden konnte. Diese Fälle zeigen, daß auch nur kurzes Zögern, wenn noch keine sichere Anzeige zur Jugularisunterbindung gegeben ist, auch leichteren Fällen zum Verhängnis werden könnte.

Von den 12 geheilten Fällen mit Jugularisunterbindung wären ohne sie bestimmt einige tödlich verlaufen. Die prompte Wirkung radikalen Vorgehens zeigt der sofortige Fieberabfall und glatte Verlauf bei 9 und 11. Bei 6, 7 und 8 stieg zwar die Temperatur nochmals an, sodaß der Sinus nochmal ausgeräumt und die Wand weiter abgetragen werden mußte, doch danach war der Verlauf fieber- und beschwerdefrei. Hier wurde offensichtlich durch die Jugularisunterbindung die Ausfaat in den Körper abgebunden, das Leben der Kranken gerettet. Bei 1, 2, 4, 5, 10 war bei der ersten Operation der Sinus normal; erneut auftretendes Fieber veranlaßte die Nachoperation, bei der nach Ausräumung der Thrombose die Jugularis unterbunden wurde. Hierauf wurden nur bei 2 weitere Nachoperationen notwendig, durch die durch schließliche Unterbindung der Jugularis communis an ihrer Einmündungsstelle in die Anonyma dem Fortschreiten der Trombose Einhalt geboten werden konnte. An diesem Fall kann man sehen, daß man bei Nichterreichen der Thrombenenden an der typischen Jugularisunterbindungsstelle oder bei unerwartetem Weiterfortschreiten trotz rechtzeitiger Unterbindung auch vor den radikalsten Operationen nicht zurückzucken darf, um die Thromben restlos auszuräumen. Bei 3 und 12 wurde erst bei der zweiten Nachoperation die Jugularis unterbunden, als die Jugularisgegend druckschmerzhaft wurde, worauf der Verlauf glatt war. Hier wäre beidesmal bei der ersten Nachoperation, bei der Sinusthrombose aufgedeckt wurde,

die Jugularisunterbindung angezeigt gewesen. Es war Glückssache, daß bei so später Vornahme der Unterbindung der Ausgang günstig war.

Die Fälle der Erlanger Klinik sind fast ausschließlich spät eingelieferte, schwere Fälle. Infolgedessen erreicht der Heilungsprozentsatz nicht den mancher anderer Kliniken. Als besonders schwere Komplikation kam bei 10 Fällen Meningitis dazu, 1 Fall war schon bei der Einlieferung im Sterben; zieht man diese Fälle ab, ergibt sich eine weit günstigere Heilungsziffer.

Von 37 Fällen heilten 26	= 70 %
„ 12 mit Jugularisunterbindung	= 60 %
„ 14 ohne „ „	= 82 %

Zusammenfassung.

Um die Sterblichkeitsziffer derjenigen, welche an vom Ohr ausgehender Allgemeininfektion bzw. Sinusthrombose erkrankt sind, weiter herabdrücken zu können, sind meines Erachtens folgende Gesichtspunkte zu beachten:

1. muß, ähnlich der nach Walter Stoeckel sich bereits günstig auswirkenden Krebsangst, die Bevölkerung auf die Gefahr vom Ohr ausgehender, schwerster, oft tödlicher Erkrankungen aufmerksam gemacht werden, um die Zahl der zu spät eingelieferten Fälle weitgehend herabzudrücken. Es darf keinen Arzt, erst recht keinen Facharzt mehr geben, der bei dem geringsten Verdacht auf Sinusthrombose und Allgemeininfektion abwartet, anstatt auf Klinikaufnahme drängt. Dadurch wird die Frühoperation ermöglicht,

2. muß die Operation radikal sein, ohne schematisch das Eintreffen bestimmter Bedingungen abzuwarten. Es ist von Fall zu Fall zu entscheiden: besteht auch nur der geringste Verdacht auf fortschreitende Thrombose und Allgemeininfektion, ist grundsätzlich die Jugularisunterbindung zu fordern, welche am besten vor der Sinusoperation, jedenfalls während oder direkt danach vorgenommen werden muß, je nach dem einzelnen Fall.

Auf Jugularisunterbindung zu verzichten, kann man ausnahmsweise bei besonders leichten Fällen unter strengster klinischer Kontrolle verantworten.

So ist zu hoffen, daß in Zukunft manches Menschenleben, das diesem heimtückischen Leiden zum Opfer fiel, zu retten ist.

Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, Seiner Magnificens, Herrn Rektor Professor Dr. med. Fr. Specht für die Anregung zu vorliegender Arbeit, sowie für die liebenswürdige Förderung, die er meiner Arbeit zuteil werden ließ, meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Abkürzungen.

Jug. Unterb., J.U	= Jugularisunterbindung.
Sin., S.	= Sinus.
petr. sup.	= petrosus superior.
transv.	= transversus.
Thr.	= Thrombus, Thrombose.
V. jug.	= Vena jugularis.
comm.	= communis.
fac. ant.	= facialis anterior.
Ot. m. ac.	= Otitis media acuta.
chron.	= chronica.
pur.	= purulenta.
Op., Oper.	= Operation.
empf.	= empfindlich.
pos., neg., + —	= positiv, negativ.
o. B.	= ohne Besonderheiten.
F.	= Fälle.

Schriftumverzeichnis.

- H. Richter*, Über oper. Heilung einer fortchr. u. rückl. otog. Thrombophleb. der Halsvenen. (Univ.-Kl. f. O., N., Kehlkopfkr. Erlangen) *Z. Laryng. usw.* 25, 336—340 (1935).
- Dixon, O. Jason*, Symposium on otolaryng. problems in sepsis. II. Newer conceptions in the management of septic sinus thrombosis. (*Laryngoscope* 44, 448—453, 1934).
- Wilson, W. Frank*, The treatment of lateral sinus thr. (*J. Laryng. a. Otol.* 48, 145—155, 1935).
- Popper, J.*, Jug. Lig. mit nachf. außergewöhn. schw. Sehstörung, hochgrad. Stauungspap. und beiderf. Abducenspar. (Österr. otol. Ges., Wien. Sitzung vom 27. 3. 33).
- Hofmann, Sin. u. Bulb.* Thr. nach ak. ot. Langw. Verl. Ausdehnung der Thr. bis in den Sin. transv. der andern Seite. Metast. in der Bauchwandmusk. Heilung. (Österr. otol. Ges., Wien. Sitzung vom 30. 10. 33).
- C. A. Fröding*, Cases of sin. thr. treated at the Sabbatsburg hospital 1926—1931. (*Acta oto-lar.*, Stockh., 19. 338—351, 1934.)
- A. Kovars*, Ot. gener. inf.; origin., management, outcome. (*Laryngosc.* 44, 373—379, 1934.)
- R. Almour*, Symp. on otolar. probl. in sepsis. III. Discussion of the basis for the selection of the type of procedure in the thr. (*Laryngosc.* 44, 454—466, 1934.)
- M. Eljasson*, Otol. Sin. Thr. (*Vestn. sovet otol.* 26, 123—125, 1933.)
- G. Krepuska*, Otol. Pyämie. (Jahresverf. der ungar. otolar. Ges. Budap. Sitzung 9.—10. 6. 33.)
- St. Krepuska*, Klin. u. path. anat. Beiträge zur Thr. phleb. des Bulbus v. jug.
- J. M. Tato*, Otol. Thr. Phleb. des Sin. sigm. (Hosp. de Ninnos, Buenos Aires). (*Rer. argent. otol. etc.* 1, 649—656, 1933).
- G. Portmann*, Traitement chir. des phlebitis et thr. phl. sinuso jugulaires. (*J. belg. Neur.* 34, 211—217, 1934).
- J. Feuz*, Remarques sur le traitement des septicémies d'origine otique. (*Clin. Univ. d'Ot. Rh. Lar.*, Bordeaux et Lausanne.) (*Rev. de Lar. etc.* 55, 969—1022, 1934.)
- J. L. Dill*, Thr. of the sigmoid or lateral sin. Report of 30 cas. (Otol. Serv. Johns Hopkins Hosp. Baltimore.) (*Arch. Lar.* 29, 705—722, 1934).
- Frühwald*, *Z. f. H.N.O. Hk.* 21, 394—415 (1935).
- Humbert, C.*, *Z. f. H.N.O. Hk.* 12, 1257—1259 (1935).
- Mormura, S.*, *Z. f. H.N.O. Hk.* 39, 103—104 (dt[sche. Zus.fass.]) (1935).
- G. P. Schneek*, *Z. f. H.N.O. Hk.* 15, 183—202 (1935).
- Neumann*, *Z. f. H.N.O. Hk.* 26—28 (1935).

Lebenslauf.

Ich, Manfred Steiner, wurde am 28. Juni 1910 zu Altensteig als Sohn des Dr. Emil Steiner, jetzigen Professors in Reutlingen, und seiner Ehefrau Berta, geb. Nestlen geboren. Nach zweijähriger Volksschulzeit in Rottweil besuchte ich die Elementarschule und das humanistische Gymnasium in Reutlingen und bestand im Februar 1929 die Reifeprüfung. Nach vorklinischem Studium in Erlangen und Tübingen bestand ich in Tübingen die ärztliche Vorprüfung. Im Wintersemester 1933/34 studierte ich in Berlin. Im Sommersemester 1933, Sommersemester 1934 in Tübingen, wo ich von April bis Oktober freiwillig im Heer diente. Im Wintersemester 1934/35, Sommersemester 1935 in Erlangen, wo ich das ärztliche Staatsexamen vor dem Prüfungsausschuß der Universität Erlangen am 17. Oktober 1935 beendete. Seit 28. Oktober 1935 bin ich als Medizinalpraktikant an der medizinischen Klinik der Universität Erlangen tätig. Seit 31. Oktober 1929 bin ich im NSDSTB. Seit 1. Juni 1931 in der SS. und NSDAP.

Lebenslauf

Ich Manfred Steiner wurde am 22. Juni 1910 in
Allersberg als Sohn des Dr. Emil Steiner, kgl. Kreis-
rath in Rottungen und seiner Ehefrau Bertha geb. Neßler geboren.
Nach zweijähriger Volksschule in Rottungen besuchte ich
die Elementarschule und das humanistische Gymnasium in
Rottungen und bestand im Februar 1926 die Reifeprüfung.
Nach vorläufigem Studium in Jülich und Tübingen
begab ich mich im Sommer des nächsten Jahres in die
Landesoberrealschule in Jülich, wo ich im Sommer
1927 die Maturatur bestand. Im Sommer 1927 wurde ich
an der Universität Bonn immatrikulirt und besuchte im
Sommer 1928 das Sommersemester 1928 in Bonn, wo ich
das erste Staatsexamen von dem Philosophischen
Fakultät in Bonn am 14. Oktober 1928 bestand.
Im Oktober 1928 bin ich als Studienassistent an die
Landesbibliothek Bonn der Universität Bonn gelangt.
Im Oktober 1929 bin ich an die Universität Bonn in
die Bibliothek des Prof. Dr. Steiner.